



FILOSOFÍA TOTAL

Elementos de exploración para la prótesis completa mandibular

Factor de inhibición de la succión	Derecha			Izquierda		
	Bueno	Regular	Malo	Bueno	Regular	Malo
1. Forma de la cresta						
2. Tejido esponjoso en la región del pliegue sublingual						
3. Espacio en la región de la fosa retromilohioidea						
4. Almohadilla retromolar en forma de pera						

Almohadilla retromolar (un riesgo es.  como Regular,  como Malo, si se marcan más de dos riesgos)

	Derecha	Izquierda
1. La presencia del tejido fibroso en la mitad anterior	(Si / Escaso / No)	(Si / Escaso / No)
2. Tamaño	(Grande / Moderado / Pequeño)	(Grande / Moderado / Pequeño)
3. Ángulo de inclinación	(Poco profundo / Moderado / Empinado)	(Poco profundo / Moderado / Empinado)
4. Cambio durante los movimientos de apertura y cierre	(Pequeño / Moderado / Grande)	(Pequeño / Moderado / Grande)

Elementos de exploración para la prótesis completa mandibular

5. Retracción de la lengua al abrir la boca	Normal (menosde 2 cm)	Retracción mayor (2-4 cm)	Una retracción aún mayor (Más de 4 cm)
6. Relación con lamandibula	Clase I	Clase II	Clase III
7. Posición de la mandibula	La posición guiada y la posición oclusal habitual coinciden o tienen una discrepancia de 2mm	Más de 2mm de discrepancia	Más de 2mm de discrepancia y punto de toma inestable
8. Función temporomandibular	Normal	Disfunción	Disfunción grave con color

Nota especial:

Tiempo de uso de la dentadura, tejido flácido(maxilar), rodetes, tejido flácido (mandibular), tubérculo geniano, vestíbulo labial poco profundo en la región anterior mandibular, etc.



N/A